



ICL TURF TIPS



FOCUS TIP: PIANTARE FIORI, CESPUGLI E ARBUSTI

La bellezza del giardino dipende anche dalle piante che lo circondano.

Creare fiorire:

- Usare terriccio ben drenante: i ristagni sono un problema anche per le piante.
- Procurarsi piante da chi usa concimi a cessione controllata → nutrizione garantita a lungo presso il cliente.
- Miscelare al terriccio **Landscaper Pro Osmocote Flora**: 1 sola applicazione
- Dalla primavera nutre fino all'autunno. Fioriture abbondanti e rigogliose a lungo.

Piantumare cespugli e arbusti:

- All'acquisto accertarsi che arbusti o alberi siano sani e carichi di nutrienti a cessione controllata (NB: dal rinvaso in vivaio al tuo acquisto possono passare 8-16 mesi).
- Lavorare bene il terreno in profondità.
- Nel foro di impianto aggiungere terriccio drenante e **Landscaper Pro Osmocote Flora** → garantisce nutrizione costante e regolare per 5-6 mesi, sostiene le piante.



La dose si calcola in base alla dimensione della fioriera e delle buche di impianto.



PREVENIRE | SPINGERE IL RINVERDIMENTO FOGLIARE

Per anticipare la fruizione di un bel prato per i tuoi clienti, usa rinverdenti fogliari contenenti biostimolanti nutrizionali azotati e chelati di ferro. Entro 5-6 ore dall'applicazione garantiscono un ottimo rinverdimento che dura molti giorni. Il colore verde scuro si attenua con il taglio.

Applicare **Vitalnova Stressbuster** su erba asciutta, in presenza di luce (meglio a metà pomeriggio), cercando di non trattare 2 volte la stessa superficie per evitare aree con gradazioni differenti di verde.



CONTROLLARE | IL MUSCHIO

La primavera è anche il periodo legato al controllo del muschio.

Concimare con **Landscaper Pro Shade Special 11-5-5 +8Fe** e trattare con il fogliare **Greenmaster Liquid Effect Iron** per uniformare il colore del prato attorno alle macchie.

Dopo 10-15 giorni arieggiare con un rastrello le macchie annerite, spazzolare e rimuovere il muschio secco.



TIP SPECIALE: CONTROLLO DEL FUSARIUM INVERNALE

Le fusariosi invernali causate dal *Microdochium nivale* possono provocare danni al tappeto erboso fino a fine marzo. Formano macchie (da 5 a circa 20 cm di diametro) prima verde "lessato" e poi brune, spesso ricoperte da un micelio bianco. I più efficaci trattamenti chimici autorizzati su tappeto erboso prevedono il fungicida **Heritage** o **Instrata Elite**.

In questa stagione se ne massimizza l'effetto con il biostimolante-rinvigorente **Vitalnova Stressbuster** e il pigmento ad azione camuffante-antistress **Ryder**.

